

ВАКЦИНАЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- ✚ При путешествии в тропические страны, а также в случае эпидемий, беременной пациентке рекомендовано проведение вакцинации с применением инактивированных и генно-инженерных вакцин, анатоксинов, оральной полиовакцины.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий. Беременной пациентке противопоказано назначение живых вакцин (Таблица 3). Беременная пациентка подписывает информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

- ✚ Трёхвалентные инактивированные вакцины рекомендуются женщинам, у которых беременность совпадает с сезоном гриппа.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий. Данные основаны на значительном уменьшении распространённости, тяжести течения и последствий гриппа у беременных женщин с потенциальной пользой для рождённых ими младенцев.

Таблица 3. Вакцинация во время беременности.

Вакцина	Применение во время беременности	Комментарий
БЦЖ ^А	Нет	
Холера	Нет	Безопасность не доказана
Гепатит А	Да в случае необходимости	Безопасность не доказана
Гепатит В	Да в случае необходимости	
Грипп	Да в случае необходимости	
Японский энцефалит	Нет	Безопасность не доказана
Корь ^А	Нет	
Менингококковая инфекция	Да в случае необходимости	Только в случае высокого риска инфицирования
Эпидемический паротит ^А	Нет ^В	
Оральная вакцина против полиомиелита	Да в случае необходимости	
Инактивированная вакцина против полиомиелита	Да в случае необходимости	Обычно не назначается
Бешенство	Да в случае необходимости	
Краснуха ^А	Нет ^В	
Столбняк/дифтерия/коклюш	Да в случае необходимости	
Тиф Ty21a ^А	Нет	Безопасность не доказана
Оспа	Нет	
Ветряная оспа ^А	Нет	
Желтая лихорадка ^А	Только в случае высокого риска инфицирования	
Грипп	В сезон гриппа	

А - живая вакцина, противопоказана во время беременности.

В - беременность должна планироваться не ранее, чем через 3 месяца после вакцинации.